

TVT LECHONES 2,5% PRESTARTER CP

FICHA TÉCNICA
Abril de 2024

Premezcla de aditivos para incorporar en fabricación de piensos para lechones.

Composición

Aditivos / kg

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto análogo

• Vitamina A (3a672a)	640.000 U.I.
• Vitamina D3 (3a671)	80.000 U.I.
• Vitamina E (3a700)	4.000 mg
• Vitamina B1 (3a821)	80 mg
• Vitamina B2 (3a825ii)	200 mg
• Vitamina B6 (3a831)	120 mg
• Vitamina B12	1,20 mg
• Niacina (3a314)	1.200 mg
• D-Pantotenato cálcico (3a841)	600 mg
• Ácido fólico (3a316)	60 mg
• Biotina (3a880)	8 mg
• Cloruro de colina (3a890)	14.000 mg
• Vitamina K3 (3a711)	80 mg
• Vitamina C (3a300)	6.000 mg

Compuestos de oligoelementos

• Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado 3b405)	5.600 mg
• Zinc (Óxido de zinc 3b603)	4.180 mg
• Manganeso (Óxido de manganeso (II) 3b502)	1.600 mg
• Hierro (Sulfato hierro (II) monohidratado 3b103)	8.800 mg
• Selenio (Selenito de sodio, 3b801)	12 mg
• Iodo (Yoduro potásico 3b201)	16 mg

Mejoradores de la digestibilidad

• Endo1,3(4)-bêta-glucanasa - EC 3.2.1.6/4a1604i	60.000 U
• Endo1,4-bêta-xylanasa - EC 3.2.1.8 /4a1604i	44.000 U
• 6-Phytase EC 3.1.3.26 (4a19)	80.000 FTU

Estabilizantes de la flora intestinal

• <i>Bacillus velezensis</i> DSM 15544 (4b1820)	1.20 x10 ¹⁰ UFC
---	----------------------------

Aminoácidos, sus sales y análogos

• L-Triptófano, técnicamente puro (3c440)	3,8 %
• L-Valina (3c370)	8,2 %

Compuestos aromatizantes

• Neohesperidina dihidrocalcona (2b959)	4.80 mg
• Sacarina sódica (E954)	2.300 mg
• Mezcla de sustancias aromáticas y apetentes	5.270 mg

Antioxidantes

• BHT (E321)	30,0 mg
• Galato de propilo (E310)	7,5 mg

Conservantes

• Ácido cítrico (1a330)	7,5 mg
-------------------------	--------

Agentes aglutinantes y antiaglomerantes

• Sepiolita (E562)	50 g
--------------------	------

Soporte c.s.:

• Carbonato cálcico, Fosfato monocálcico, Butirato sódico (Sal sódico de ácidos grasos), Óxido de magnesio.	
---	--

Incluye CAPMAG^{ZN}, cuya tecnología optimiza la biodisponibilidad del zinc gracias a la protección del magnesio: puede transportar ZnO a través del estómago sin liberarlo y hacerlo en el intestino, donde se producirá la absorción de Zn²⁺ biodisponible.

Modo de empleo

- Incorporar 25 kg/ton por tonelada de pienso.
- Utilización reservada a los fabricantes de piensos compuestos. Para lechones desde la 5ª semana después del destete hasta 8 semanas después del destete. Se recomienda consultar a un técnico cualificado antes de utilizar.
- El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

Presentación

- Sacos de 25 kg

Almacenamiento

- Conservar el envase cerrado, en lugar seco, fresco y apartado de la luz.
- Consumir preferentemente antes de transcurridos 12 meses de la fecha de fabricación.



TVT NUTRITION

La nutrición animal sostenible

info@tvtnutrition.com +34 916 10 08 61
C/de Galileo y Galilei, 118, 28939 Arroyomolinos, Madrid

