


Intervenção Farmacêutica na Dispensa de Sildenafil Desay 50 mg

O Sildenafil Desay 50 mg pertence à classe dos inibidores da fosfodiesterase 5, recomendados em várias orientações e *guidelines* internacionais, como tratamento de primeira linha para a Disfunção Erétil (DE). Atualmente, está classificado como Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF).

Para uma dispensa correta e segura deste medicamento, propõe-se a seguinte abordagem sistematizada:



¹Documentação oficial de apoio à dispensa

- Guia de Apoio à Dispensa EF, em PDF
- Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia (EF), em PDF
- Checklist para preenchimento pelo farmacêutico na avaliação do utente, em PDF e [formato eletrónico](#)
- Cartões de dispensa e de referenciação médica, em PDF ou gerados automaticamente caso use a [checklist eletrónica](#)

Todos os documentos em PDF (Guia, Protocolo, Checklist e Cartões de dispensa) estão disponíveis no ANFOnline, na ficha do medicamento no Sifarma®, e na área reservada ao profissional de saúde do [site www.desay.pt](#). A checklist eletrónica pode ser acedida diretamente neste [link](#).

Notas: 1) Recomenda-se a leitura do Guia de Apoio à Dispensa EF previamente à primeira dispensa de Sildenafil Desay 50 mg. 2) Os cartões podem ser impressos ou enviados digitalmente ao utente, após preenchimento da data e nome do farmacêutico.

²Critérios que impossibilitam a primeira dispensa

- Homens com:
 - < 18 anos
 - Sem DE
 - Sob tratamento com uma dose diferente de sildenafil ou outro fármaco para a DE
 - Com alergia ao Sildenafil Desay ou excipientes
 - Sem diagnóstico prévio de DE
 - Sem causa de DE identificada
- Pelo menos uma resposta positiva na avaliação de risco cardiovascular, da medicação concomitante e/ou das comorbilidades

³Critérios que impossibilitam dispensas subsequentes

- Alteração do estado de saúde ou início de uma nova medicação, que determine pelo menos uma resposta positiva na avaliação de risco cardiovascular, da medicação concomitante e/ou das comorbilidades
- Ter sentido um efeito indesejável ou outro problema relacionado com a toma do medicamento
- Estar a tomar o medicamento de forma diária e continuada